

# K P O

## FERTILIZANTE INORGANICO

### APLICACIÓN FOLIAR Y EDAFICA

COMPOSICIÓN:	p/p
Fosforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) .....	40 %
Potasio (K <sub>2</sub> O) .....,,,,	51%

**CORRECTOR DE DEFICIENCIAS DE FOSFORO Y POTASIO**

#### Recomendaciones de uso:

Para el cultivo de rosas para corregir deficiencias de ambos elementos y mejorar el desarrollo del cultivo en general se recomienda aplicación foliar a una dosis de 1.0g/l con intervalo de 7 días; cuando quiera acelerar apertura de brote y adelantar producción, se recomienda aplicación en altas dosis por drench de 25 kg/ha durante 2 días seguidos.

En cultivo de papa aplicar en etapa de maduración para engrose de tubérculos a una dosis de 500 g/ tanque de 200lt una sola vez.

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	VIA DE APLICACIÓN
Rosas ( <i>Rosa sp.</i> )	1,0 g/l	Etapa productiva (cuando presente esta deficiencia).	Foliar
	25 kg/ha	Etapa productiva	Drench
Papa ( <i>S. tuberosum</i> )	500 g/ tanque de 200 litros	Etapa de maduración (Engrose de tubérculos)	Foliar
Tomate Riñon ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )	500 g/ tanque de 200 litros	Etapa de Fructificación	Foliar
Pimiento ( <i>Capsicum annum</i> )	500 g/ tanque de 200 litros	Etapa de Fructificación	Foliar