

BIOFOLIC 10

BIOESTIMULANTE

APLICACIÓN FOLIAR

COMPOSICIÓN:

ACIDO FÓLICO.....10,0 % p/v

Activador de yemas florales

Recomendaciones de uso:

BIOFOLIC 10 es un producto formulado para estimular la activación de yemas florales. El pH de aplicación entre 5.5 – 6.5.

Es rápidamente absorbido. Es fácilmente soluble.

NOTA: para inhibir tallos ciegos se recomienda aplicaciones semanales durante cuatro semanas luego de la poda.

| CULTIVO | DOSIS | EPOCA DE APLICACION | VIA DE APLICACIÓN |
|---|---------------------------------|---|-------------------|
| Rosas (<i>Rosa sp.</i>) | 1,0 ml/l * | Etapa productiva (cuando exista la presencia de ciegos) | Foliar |
| Tomate Riñon (<i>Lycopersicon esculentum</i>) | 1,25 ml/l 250 ml/ 200 litros | Etapa de Floración y Fructificación | Foliar |
| Pimiento (<i>Capsicum annum</i>) | 1,25 ml/l 250 ml/ 200 litros | Pre Floración | Foliar |
| Cacao (<i>Theobroma cacao</i>) | 1,25 ml/l ** | Pre floración | Foliar |
| Piña (<i>Ananas comosus</i>) | 3 l/ha *** | Pre Floración | Foliar |
| Aguacate (<i>Persea americana</i>) | 1,25 ml/l **** | Pre Floración | Foliar |

* Con un descargo de agua de 8 lt/cama.

** Con descarga de agua de 5 litros de agua por 6 plantas (esto puede cambiar de acuerdo al tamaño de las plantas).

*** 3000 litros de agua/ hectárea

**** 3-10 tanques por hectárea, dependerá de la edad y tamaño del cultivo.

PRESENTACIÓN: Envases de 250cc, 500cc, 1, 4 y 20 lts